




科研製薬株式会社

農林水産省登録 1キロ粒剤 第24337号
フロアブル 第23996号
ジャンボSD 第24611号



いざ、雑草を
なぎ倒せ。

SD製剤[※]の
ジャンボ剤
新規登録

※SD(スイフトダイナミック)製剤は
拡散性に優れた軽量・少量自己拡散型の新規製剤です。




イザナギ[®]

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボSD

ほふく性雑草に有効。
(イボクサ、キシュウスズメノヒエ)
(1キロ粒剤・フロアブル)

田植同時散布機、無人航空機での散布可能
(1キロ粒剤・フロアブル)



ノビエ




ホタルイ



イボクサ



コナギ



クログワイ



コウキヤガラ



オモダカ



ウリカワ

イザナギ[®] 1キロ粒剤 フロアブル ジャンボSD

イザナギ1キロ粒剤 登録番号第24337号 トリアファモン0.50%、ベンゾピシクロン2.0%、ペントキサゾン2.5%
イザナギフロアブル 登録番号第23996号 トリアファモン0.94%、ベンゾピシクロン3.8%、ペントキサゾン5.7%
イザナギジャンボSD 登録番号第24611号 トリアファモン2.5%、ベンゾピシクロン10.0%、ペントキサゾン15.0%

包装規格 1キロ粒剤 1kg×12袋 4kg×4袋
フロアブル 500ml×20本 2ℓ×6本
ジャンボSD (20g×10)×20袋



特長

- ① 新規有効成分トリアファモン配合でノビエを含む各種雑草に高い効果を示します
- ② SU抵抗性雑草、ほふく性雑草(イボクサ、キシュウズメノヒエ)*にも有効
- ③ イネに対する高い安全性、田植同時処理が可能
- ④ 大型包装規格有(4kg包装、2ℓ包装)、無人航空機での散布に対応
- ⑤ 拡散性に優れた軽量・自己拡散型のSD(スイフト ダイナミック)製剤のジャンボ剤

* (1キロ粒剤、フロアブル)

1キロ粒剤の適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数*	使用方法
移植 水稲	一年生 及び 多年生雑草	移植時 移植直後～ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	1kg/10a	本剤…1回 トリアファモン…2回以内 ベンゾピシクロン…3回以内 ペントキサゾン…2回以内	田植同時散布機で施用
直播 水稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1.5葉期～ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで			湛水散布 又は無人航空機による 散布

各種雑草の散布適期(1キロ粒剤)

- ノビエ、ホタルイ/3葉期まで
- ミズガヤツリ/草丈15cmまで
- ウリカワ、ヘラオモダカ/2葉期まで
- ヒルムシロ/発生盛期まで
- セリ/再生期まで
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ/発生始期まで
- シズイ/草丈3cmまで
- キシュウズメノヒエ/再生茎3葉期まで
- イボクサ(一年生雑草)/再生始期まで
- エゾノサヤカグサ/2葉期まで

フロアブルの適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数*	使用方法
移植 水稲	一年生雑草 及び 多年生雑草	移植時 移植直後～ノビエ3.5葉期 ただし、 移植後30日まで	500ml/10a	本剤…1回 トリアファモン…2回以内 ベンゾピシクロン…3回以内 ペントキサゾン…2回以内	田植同時散布機で施用 原液湛水散布、水口施用 又は無人航空機による 滴下
直播 水稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1.5葉期～ノビエ3.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			原液湛水散布 又は無人航空機による 滴下

各種雑草の散布適期(フロアブル)

- ノビエ/3.5葉期まで
- ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ/3葉期まで
- ミズガヤツリ/4葉期まで
- ヒルムシロ/発生期まで
- セリ/再生期まで
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ/発生始期まで
- シズイ/草丈3cmまで
- キシュウズメノヒエ/再生茎3葉期まで
- イボクサ(一年生雑草)/再生始期まで
- エゾノサヤカグサ/2葉期まで

ジャンボSDの適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数*	使用方法
移植 水稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ	移植直後～ノビエ3.5葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装(パック) 10個(200g) /10a	本剤…1回 トリアファモン…2回以内 ベンゾピシクロン…3回以内 ペントキサゾン…2回以内	水田に 小包装(パック)のまま 投げ入れる

各種雑草の散布適期(ジャンボSD)


- ノビエ/3.5葉期まで
- ホタルイ、ウリカワ/3葉期まで
- ミズガヤツリ/草丈20cm
- ヘラオモダカ/4葉期まで
- ヒルムシロ/発生盛期
- セリ/増殖期

*印は収穫後の残留回避のため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

イザナギ剤の上手な使い方



ジャンボ剤の散布方法



幅30m規模の水田では、畦畔から散布ができます。
※幅40mを超える水田では、畦畔散布に加えて田内散布も行なってください。

畦畔を歩きながら、7～10m間隔で投げ入れてください。

効果・薬害等の注意(一部抜粋、3製剤共通)

- いぐさ、れんこん、くわい、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意する。
- いぐさの栽培予定水田では本剤を使用しない。
- 薬害を生じるおそれがあるので、後作物としてなす、たまねぎ及びさやえんどうを栽培しない。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- 使用前にはラベルをよく読んで下さい。
- ラベルの記載以外には使用しないで下さい。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

この資料は2022年2月末の登録内容に基づいたものです。



科研製薬株式会社

東京都文京区本駒込2丁目28-8

<http://www.kaken.co.jp>

IZF/INF/007