



Swift Dynamic



いざ、雑草を
なぎ倒せ。

拡散性に
優れたSD製剤※
ジャンボ剤・
200SD粒剤

※SD(スイフトダイナミック)製剤は
拡散性に優れた軽量・少量自己拡散型の新製剤です。

大型規格
あり

大型規格
あり



イザナギ®

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボSD・200SD粒剤

ほふく性雑草に有効。

(イボクサ、キシュウスズメノヒエ)
(1キロ粒剤・フロアブル)

無人航空機での散布可能

(1キロ粒剤・フロアブル・200SD粒剤)



ハビエ



ホタルイ



イボクサ



コナギ



クログワイ



コウキヤガラ



オモダカ



ウリカワ

イザナギ[®] 1キロ粒剤 フロアブル ジャンボSD 200SD粒剤

イザナギ1キロ粒剤 登録番号第24337号 トリアファモン0.50%、ベンゾピシクロン2.0%、ペントキサゾン2.5%
イザナギフロアブル 登録番号第23936号 トリアファモン0.94%、ベンゾピシクロン3.8%、ペントキサゾン5.7%
イザナギジャンボSD 登録番号第24611号 トリアファモン2.5%、ベンゾピシクロン10.0%、ペントキサゾン15.0%
イザナギ200SD粒剤 登録番号第24613号 トリアファモン2.5%、ベンゾピシクロン10.0%、ペントキサゾン15.0%

包装規格 1キロ粒剤 1kg×12袋 4kg×4袋
フロアブル 500ml×20本 2L×6本
ジャンボSD (20g×10)×20袋
200SD粒剤 800g(40a)×4袋



特長

- ① 新規有効成分トリアファモン配合でノビエを含む各種雑草に高い効果を示します
- ② SU抵抗性雑草、ほふく性雑草(イボクサ、キシュウスズメノヒエ)*にも有効
*(1キロ粒剤、フロアブル)
- ③ イネに対する高い安全性、田植同時処理が可能
- ④ 大型包装規格有(4kg包装、2L包装)、無人航空機での散布に対応
- ⑤ 拡散性に優れた軽量・自己拡散型のSD(スィフト ダイナミック)製剤のジャンボ剤・200SD粒剤

1キロ粒剤の適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法
移植 水稲	一年生 及び 多年生雑草	移植時 移植直後～ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで	1kg/10a	田植同時散布機で施用
直播 水稲	一年生雑草 及び マツバ、ホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ ヒルムシロ、セリ	稲1.5葉期～ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで		湛水散布 又は無人航空機による 散布

各種雑草の散布適期(1キロ粒剤)	
●ノビエ、ホタルイ/3葉期まで	●シズイ/草丈3cmまで
●ミズガヤツリ/草丈15cmまで	●キシュウスズメノヒエ/ 再生葉3葉期まで
●ウリカワ、ヘラオモダカ/2葉期まで	●イボクサ(一年生雑草)/ 再生始期まで
●ヒルムシロ/発生盛期まで	●エゾノサヤヌカサ/2葉期まで
●セリ/再生期まで	
●オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ/ 発生始期まで	

フロアブルの適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法
移植 水稲	一年生雑草 及び 多年生雑草	移植時 移植直後～ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	500ml/10a	田植同時散布機で施用 原液湛水散布、水口施用 又は無人航空機による 滴下
直播 水稲	一年生雑草 及び マツバ、ホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ ヒルムシロ、セリ	稲1.5葉期～ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで		原液湛水散布 又は無人航空機による 滴下

各種雑草の散布適期(フロアブル)	
●ノビエ/3.5葉期まで	●シズイ/草丈3cmまで
●ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ/ 3葉期まで	●キシュウスズメノヒエ/ 再生葉3葉期まで
●ミズガヤツリ/4葉期まで	●イボクサ(一年生雑草)/ 再生始期まで
●ヒルムシロ/発生期まで	●エゾノサヤヌカサ/2葉期まで
●セリ/再生期まで	
●オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ/ 発生始期まで	

ジャンボSDの適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法
移植 水稲	一年生雑草 及び マツバ、ホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ、セリ	移植直後～ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	小包装(パック) 10個(200g) /10a	水田に 小包装(パック)のまま 投げ入れる

各種雑草の散布適期(ジャンボSD)	
●ノビエ/3.5葉期まで	●ヒルムシロ/発生盛期
●ホタルイ、ウリカワ/3葉期まで	●セリ/増殖期
●ミズガヤツリ/草丈20cm	
●ヘラオモダカ/4葉期まで	

200SD粒剤の適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法
移植 水稲	一年生雑草 及び マツバ、ホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ、セリ	移植直後～ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	200g/10a	湛水散布 又は無人航空機による 散布

各種雑草の散布適期(200SD粒剤)	
●ノビエ/3.5葉期まで	●ヒルムシロ/発生盛期
●ホタルイ、ウリカワ/3葉期まで	●セリ/増殖期
●ミズガヤツリ/草丈20cm	
●ヘラオモダカ/4葉期まで	

有効成分の総使用回数*(4製剤共通)

本剤…1回 トリアファモン…2回以内 ベンゾピシクロン…3回以内 ペントキサゾン…2回以内

*印は収穫後の残存回数のため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

イザナギ剤の上手な使い方



200SD粒剤 ドローンによる散布方法

圃場周辺への飛散防止と薬剤を十分拡散させるために、
以下の条件を守って散布してください。

散布条件	●飛行高度：2～3m ●風速：3m/秒以下 ●畦畔からの距離：10m以上 ●水深：5cm以上
散布幅	30m以下*(片側15mで拡散します) *薄、浮草、表層剥離が発生している場合は適宜、散布幅を狭めてください。

効果・薬害等の注意(一部抜粋、4製剤共通)

- いぐさ、れんこん、くわい、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意する。
- いぐさの栽培予定水田では本剤を使用しない。
- 薬害を生じるおそれがあるので、後作物としてなす、たまねぎ及びさやえんどうを栽培しない。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- 使用前にはラベルをよく読んで下さい。
- ラベルの記載以外には使用しないで下さい。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

この資料は2023年1月末の登録内容に基づいたものです。

科研製薬株式会社
KAKEN 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

詳しくはこちら

