

殺菌剤

ジオゼット®

®は科研製薬(株)の登録商標

水和剤

適用拡大!

「きゅうり」と「ねぎ」に

環境保全型農業に!!



ねぎ 黒斑病



きゅうり うどんこ病



キャベツ 株腐病



レタス すそ枯病

病害写真提供: HP埼玉の農作物病害虫写真集

病害写真提供: 長野県野菜花き試験場 小木曾 秀紀



科研製薬株式会社

殺菌剤

ジオゼット®

水和剤

農林水産省登録
第23575号有効年限:6年
包装規格:100g袋×50袋
1kg袋×20袋成分:ポリオキシシンD亜鉛塩・・・2.25% (ポリオキシシンDとして 20,000 PsDu/g)
鉱物質微粉、界面活性剤等・・・97.75% (ポリ(オキシエチレン) = ノニルフェニルエーテル (PRTR・1種) 3.0%)

特長

- 1 リゾクトニア病害に優れた予防・治療効果を示します。
- 2 独自の作用性(キチン生合成阻害)で既存薬剤耐性菌にも有効です。
- 3 訪花昆虫や天敵への影響がほとんどなくIPM防除にも利用できます。
- 4 他の作用性の異なる薬剤とのローテーション散布に最適です。
- 5 微生物由来の天然物質成分であり、化学合成農薬ではありません。
- 6 製剤特有の臭いもありません。


適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシシンを含む農薬の総使用回数	
きゅうり	うどんこ病	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
キャベツ	株腐病			収穫 14日前まで	3回以内		散布	7回以内 (種子浸漬は1回以内、1000倍希釈 灌注は1回以内、2500倍希釈灌注は 2回以内、散布は3回以内)
レタス	すそ枯病							3回以内
非結球レタス								
ねぎ	黒斑病 さび病			3回以内				

試験成績


レタス すそ枯病

- 試験場所:日本植物防疫協会
茨城研究所 2013年
- 品 種:みずさわ 1区 6.5m²
48株 3反復
- 発生状況:中発生
- 処 理 量:140~300ℓ/10a
- 調 査 日:6月26日(最終散布後7日)
- 薬害(汚れ):一(一)




ねぎ 黒斑病

- 試験場所:新潟県農業総合研究所
園芸研究センター 2013年
- 品 種:夏扇4号 1区 4m²
200株 3反復
- 発生状況:少発生
- 処 理 量:250ℓ/10a
- 調 査 日:9月26日(最終散布後6日)
- 薬害(汚れ):一(一)
- 展着剤ハイテンパワー5000倍加用




きゅうり うどんこ病

- 試験場所:日本植物防疫協会
高知試験所 2014年
- 品 種:ズバリ163 1区 7.5m²
10株 3連制
- 発生状況:中発生
- 処 理 量:180~200ℓ/10a
- 調 査 日:4月3日(最終散布後7日)
- 薬害(汚れ):一(一)



ねぎ さび病

- 試験場所:新潟県農業総合研究所
園芸研究センター 2013年
- 品 種:夏扇4号 1区 6m²
300株 3反復
- 発生状況:少発生(接種)
- 処 理 量:250ℓ/10a
- 調 査 日:10月30日(最終散布後7日)
- 薬害(汚れ):一(一)
- 展着剤ハイテンパワー5000倍加用



科研のエコ農薬



本剤の特別栽培農産物に対する取り組み……………

本剤は化学合成農薬ではなく、熊本県阿蘇地方の土壌放線菌を使い、発酵により得られた天然物質農薬であり、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」において節減対象農薬から除外することが可能です。(それぞれの地方自治体等が独自に定める農薬使用基準においては除外されない場合があります。)

ジオゼット水和剤の
技術情報が携帯電話で
ご覧いただけます。



http://www.kaken.co.jp/nou_doubutsu/agro/product/geoz.html

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。●空袋は農場などに放置せず適切に処理してください。



科研製薬株式会社

東京都文京区本駒込2丁目28-8

<http://www.kaken.co.jp>

GEO/INF/003