

メタミホップ配合



高菜齡のノビエに!

乾田期の防除で

ノビエに**トドメ**!



トドメMF
乳剤



トドメバズMF
液剤

®は科研製薬株式会社の登録商標

※トドメバズMF液剤のみの登録



ノビエ



オオクサキビ



アゼガヤ※



ホタルイ※

出典：森田 弘彦

出典：植調協会

乾田期の防除でノビエにトドメ!



■特長・適用雑草と使用方法(直播水稻 抜粋)

ノビエ専門・希釈して茎葉散布

農林水産省登録：第23959号 有効成分…メタミホップ：4.9% 人畜毒性：普通物※
※毒物及び劇物取締法(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

トドメMF[®]

乳剤

- 高葉齢のノビエに高い効果を示します。
- 除草効果の発現が早く、枯れ上がりに優れます。
- 水稻に対し高い安全性があります。
- 展着剤不要で、耐雨性にも優れます。

除草剤分類 1

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	メタミホップを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
直播水稻	ノビエ オオクサキビ	は種後10日～ノビエ6葉期 但し、収穫50日前まで	200mℓ/10a	100ℓ/10a	2回以内	雑草茎葉散布 又は全面散布	3回以内

ノビエ+広葉も対応・希釈して落水茎葉散布

農林水産省登録：第24369号 有効成分…ベンタゾン：18.3%、メタミホップ：1.2% 人畜毒性：普通物※
※毒物及び劇物取締法(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

トドメバスMF[®]

液剤

- 高葉齢のノビエに卓効のメタミホップと、広葉雑草に効果の高いベンタゾン
を配合した茎葉処理除草剤です。
- 生育の進んだ各種雑草に対して高い効果が期待できます。
- 除草効果の発現が早く、枯れ上がりに優れます。

除草剤分類 1.6

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法
			薬量	希釈水量		
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ ミズガヤツリ、ウリカワ	は種後10日～ ノビエ6葉期 但し、収穫50日前まで	1000mℓ /10a	70～100ℓ /10a	2回以内	乾田・落水状態で 雑草茎葉散布又は 全面散布


ベンタゾンを含む農薬の総使用回数

2回以内

メタミホップを含む農薬の総使用回数

3回以内

■トドメMF乳剤・トドメバスMF液剤の散布時期と体系処理の例(乾田直播栽培時)



⚠ 効果・薬害等の注意事項(一部抜粋)

■トドメMF乳剤

- 高葉齢のイネ科雑草に高い効果を示します。(ノビエは6葉期まで、オオクサキビは5葉期まで)
- 広葉雑草には効果がないので、広葉雑草が混在する圃場ではそれらに有効な剤と、組み合わせて使用する(トドメバスMF液剤の使用を推奨します)。
- 雑草茎葉にかかるよう散布する。
- 散布する際はまきむらのないよう均一に散布する。
- 周辺作物(特にイネ科作物)に対して、薬害を生じるおそれがあるので、飛散しないように注意して散布する。

■トドメバスMF液剤

- 薬害のおそれがあるので、展着剤は加用しない。
- 散布する前に落水状態にして水の出入りを止め、まきむらのないよう均一に散布する。
- 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天が持続する時を選んで使用する。
- 重複散布は薬害のおそれがあるのでさける。
- 軟弱徒長苗での使用はさける。
- 高温条件下では、薬害が生じやすいので異常高温下での散布はさける。
- 乾燥が続いた条件では除草効果が低下する場合があるので注意する。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

この資料は2026年4月1日現在の登録内容に基づいて作成しています。