

真

打ち

草のない、
きれいな田んぼが。
見えますか。



田植同時処理
できます。



ノビエ



ミスガヤツリ



コナギ



クログワイ



マツバイ



ホタルイ



コウキヤガラ



アメリカアゼナ



シンウチ® EW 1キロ粒剤

EW: 農林水産省登録 第22742号 1キロ粒剤: 農林水産省登録第22743号

科研製薬株式会社

特長

■植代時から田植前7日または移植直後からノビエ1葉期(移植後30日まで)の処理で、幅広い雑草の初期成育を抑えます。

■近年増加しているSU(スルホニルウレア)剤抵抗性雑草に対しても有効です。

適用雑草および使用方法

■シンウチEW


本資料は平成27年10月現在の知見に基づいて作成されております。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ クログワイ コウキヤガラ	植代後～移植前7日または 移植直後～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで	500ml/10a	本剤：1回 ブタクロール： 2回以内 ペントキサゾン： 2回以内	原液湛水散布
		移植時			田植同時散布機で施用
		植代時(移植7日前まで)			植代時に原液のまま散布し 混和する
直播水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ	湛水直播の代かき時 (は種7日前まで)	300ml/10a		代かき時に原液のまま散布し 混和する
		湛水直播の代かき後～ は種前7日			原液湛水散布

■シンウチ1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ クログワイ コウキヤガラ	植代後～移植前7日または 移植直後～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで	1kg/10a	本剤：1回 ブタクロール： 2回以内 ペントキサゾン： 2回以内	湛水散布
		移植時			田植同時散布機で施用

上手な使い方 (散布後は雑草の種類や発生状況に合わせて、一発処理除草剤や中期除草剤との体系で使用してください。)



※シンウチEWは田植後に散布する場合は薬害が生じる恐れがあるので、直接苗にかからないように散布してください。

田植同時処理機(こまきちゃんCS-10)のダイヤル目安表

田植機	横送り回数	株間 (cm)							
		12	13	14	16	18	21	24	30
6条植	16回	2.6	2.7	2.9	3.3	3.6	4.1	4.6	5.6
	20回	3.1	3.3	3.5	3.9	4.4	5	5.6	6.9
	26回	3.9	4.1	4.4	5	5.5	6.3	7.2	8.8
8条植	16回	3.3	3.5	3.7	4.2	4.6	5.3	6.0	7.4
	20回	3.9	4.2	4.5	5.1	5.6	6.5	7.4	9.1
	26回	5.0	5.3	5.7	6.4	7.2	8.3	9.4	11.6

※上記数値はあくまで目安のため必ず作業時に確認してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●防除日誌を記帳しましょう。



製造販売元

科研製薬株式会社

東京都文京区本駒込2丁目28-8

http://www.kaken.co.jp

SIEW&SIGR/INF/002