


水稲用一発処理除草剤

# テマエース®

1キロ粒剤・フロアブル

田植同時散布  
が可能！

長  
く  
見  
守  
る。



長  
く  
効  
い  
て



ノビエ



コナギ



ホタルイ



クログワイ



オモダカ



シズイ

農林水産省登録 [1キロ粒剤] 第23582号 [フロアブル] 第23583号

® は科研製薬(株)の登録商標



科研製薬株式会社



- ① 田植同時散布が可能
- ② 優れた残効性により早めの散布でも長期間雑草を抑制
- ③ ノビエを含む一年生雑草へ安定した効果を発揮

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| フロアブル | [500mℓ] 500mℓ×20本<br>[ 2ℓ ] 2ℓ×6本 |
| 1kg粒剤 | [ 1kg ] 1kg×12袋<br>[ 4kg ] 4kg×4袋 |

## ■1キロ粒剤の適用雑草と使用方法

有効成分／イマズスルフロン(0.90%) ダイムロン(15.0%) ペントキサゾン(3.9%)

| 作物名  | 適用雑草名                                                                                                        | 使用時期                                      | 適用土壌       | 使用量     | 本剤の使用回数 | 使用方法               | 適用地帯                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|---------|--------------------|------------------------|
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 及び<br>マツバイ<br>ホタルイ<br>ウリカワ<br>ミスガヤツリ<br>ヘラオモダカ<br>(北海道、東北、北陸)<br>ヒルムシロ<br>セリ<br>アオミドロ・藻類による<br>表層はく離 | 移植時                                       | 砂壤土<br>～埴土 | 1kg/10a | 1回      | 田植同時<br>散布機で<br>施用 | 全域の普通期<br>及び<br>早期栽培地帯 |
|      |                                                                                                              | 移植直後～<br>ノビエ1.5葉期<br>ただし、<br>移植後<br>30日まで |            |         |         | 湛水散布               |                        |

## ■有効葉齢

| 適用雑草名  | 有効葉齢            |
|--------|-----------------|
| ノビエ    | 1.5葉期まで         |
| ホタルイ   | 2葉期まで           |
| ウリカワ   | 2葉期まで           |
| ミスガヤツリ | 2葉期まで           |
| ヘラオモダカ | 2葉期まで           |
| ヒルムシロ  | 発生期まで           |
| セリ     | 再生前から<br>再生始期まで |
| 表層はく離  | 発生前             |

## ■フロアブルの適用雑草と使用方法

有効成分／イマズスルフロン(1.7%) ダイムロン(28.0%) ペントキサゾン(7.3%)

| 作物名  | 適用雑草名                                                                                                                                                                      | 使用時期                                      | 適用土壌       | 使用量           | 本剤の使用回数 | 使用方法               | 適用地帯                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|---------|--------------------|------------------------|
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 及び<br>マツバイ<br>ホタルイ<br>ウリカワ<br>ミスガヤツリ<br>ヘラオモダカ<br>(北海道、東北、北陸)<br>ヒルムシロ<br>クログワイ<br>(東北、関東・東山・東海)<br>オモダカ<br>(東北、関東・東山・東海)<br>シズイ(東北)<br>セリ<br>アオミドロ・藻類による<br>表層はく離 | 移植時                                       | 砂壤土<br>～埴土 | 500mℓ<br>/10a | 1回      | 田植同時<br>散布機で<br>施用 | 全域の普通期<br>及び<br>早期栽培地帯 |
|      |                                                                                                                                                                            | 移植直後～<br>ノビエ1.5葉期<br>ただし、<br>移植後<br>30日まで |            |               |         | 原液湛水散布<br>又は水口施用   |                        |


## ■有効葉齢

| 適用雑草名  | 有効葉齢            |
|--------|-----------------|
| ノビエ    | 1.5葉期まで         |
| ホタルイ   | 2葉期まで           |
| ウリカワ   | 2葉期まで           |
| ミスガヤツリ | 2葉期まで           |
| ヘラオモダカ | 2葉期まで           |
| ヒルムシロ  | 発生期まで           |
| クログワイ  | 発生始期まで          |
| オモダカ   | 発生前             |
| シズイ    | 発生前             |
| セリ     | 再生前から<br>再生始期まで |
| 表層はく離  | 発生前             |

## ■有効成分の総使用回数【1キロ粒剤・フロアブル共通】

|                         |      |                      |                                |                        |      |
|-------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------------------------|------|
| イマズスルフロンを含む<br>農業の総使用回数 | 2回以内 | ダイムロンを含む<br>農業の総使用回数 | 3回以内 (育苗箱散布は1回以内、<br>本田では2回以内) | ペントキサゾンを含む<br>農業の総使用回数 | 2回以内 |
|-------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------------------------|------|

## ■上手な使い方



## ■田植同時処理機(こまきちゃんCS-10)のダイヤル目安表

※下記数値はあくまで目安のため必ず作業時に確認してください。

| 株間(cm) | 条数と横送り回数(回) |     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |      |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
|        | 4条          |     |     | 5条  |     |     | 6条  |     |      | 7条  |      |      |
|        | 16          | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26   | 16  | 20   | 26   |
| 12     |             |     |     | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 4.9  | 3.9 | 5.0  | 6.6  |
| 13     | 1.9         | 2.5 | 3.4 |     |     |     |     |     |      |     |      |      |
| 14     | 2.1         | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 3.4 | 4.3 | 5.7  | 4.6 | 5.9  | 7.8  |
| 16     | 2.5         | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 4.1 | 5.4 | 3.9 | 5.0 | 6.6  | 5.4 | 6.6  | 8.9  |
| 18     | 2.8         | 3.6 | 4.9 | 3.6 | 4.7 | 6.2 | 4.5 | 5.7 | 7.5  | 6.1 | 7.7  | 10.1 |
| 21     | 3.4         | 4.3 | 5.7 | 4.3 | 5.5 | 7.3 | 5.3 | 6.7 | 8.8  | 7.1 | 9.0  | 13.6 |
| 24     | 3.9         | 5.0 | 6.6 | 5.0 | 6.3 | 8.4 | 6.1 | 7.7 | 10.1 | 8.2 | 10.4 | 11.1 |

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。●防除日誌を記帳しましょう。



科研製薬株式会社  
東京都文京区本駒込2丁目28-8  
<http://www.kaken.co.jp/>